

# VIES

## VIGILAU:

**PUNT.** Revisau el punt de punció: ha d'estar visible, net i sense signes infecció.

**APÒSIT.** Canviau-lo cada 7 dies o sempre que estigui brut, desferrat, humit, o per qualsevol altre motiu. Utilitzau tècnica asèptica (es recomanen guants estèrils).

**SISTEMA.** Canviau-lo:

- Cada 96 hores, davant qualsevol desconexió o en substituir el catèter,
- Equips per administrar hemoderivats: després de cada hemoderivat o cada 12 hores.
- Equips de nutrició parenteral: cada 24 hores.
- Equips per administració intermitent: després de cada ús.

**REGISTRAU.**

## EDUCAU EL PACIENT:

- El punt de punció ha d'estar sempre visible.
- Tapar la via per a la higiene a la dutxa i destapar-la després.
- Ha d'anar alerta que la via no s'embruti a l'hora de menjar.
- Ha d'avisar la infermera si l'apòsit està brut, desferrat o humit.
- És important que avisi si la via li fa mal o si la zona està enrogida.

**REGISTRAU.**

## SALINITZAU:

- Sempre amb 10ml. de SF.
- Després d'infondre-hi el tractament. En les línies mitjanes o centrals, emprau-hi la tècnica flush-stop.
- Mantenir les llums sempre tancades amb taps o bioconnectors.
- Els taps són d'un sol ús.
- RECORDAU-VOS d'aseptitzar amb clorhexidina alcohòlica.

